

ÜZVİ KİMYADA OKSİDLƏŞMƏ-REDUKSIYA REAKSİYALARI


N.Ə. Əkbərov, S.Z.Abdullayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti


Bu məqalə orta məktəb səviyyəsində üzvi kimyada rast gəlinən oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının (ORR) izahına həsr olunmuşdur. Məqalədə üzvi birləşmələrdə elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin asan yolla təyini də öz əksini tapmışdır. Üzvi kimyada ORR-in əsas mahiyyəti izah edilmiş, ilk baxışda ORR kimi görünməyən reaksiyaların əsl həqiqətdə ORR olması sübut olunmuş və onlara aid nümunələr göstərilmişdir.

Orta məktəb dərsliklərində və ən çox istifadə olunan kimyadan dərs vəsaitlərində [1-6] üzvi kimyada oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları barədə çox məhdud dərəcədə informasiya var. Ona görə də şagirdlərə kömək məqsədilə bu mövzuya müraciət etdik.

Üzvi kimyada da oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsilə gedən reaksiyalar *oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları* adlanır. Məsələn:



Bu reaksiyada CH_4 – reduksiyaedici, Cl_2 isə oksidləşdiricidir. Belə ki, metandakı C atomunun oksidləşmə dərəcəsi -4-dən -2-yə kimi yüksəlir, yəni o, özündən 2 elektron verərək, *oksidləşir*. Xlor molekulundakı xlor atomunun oksidləşmə dərəcəsi 0-dan -1-ə kimi azalır, yəni o, özünə 1 elektron birləşdirərək, *reduksiya olunur* (2 Cl atomu isə 2 elektron birləşdirir). Bu reaksiyanın elektron tənlikləri aşağıdakı kimi olacaq:



Qeyd etmək lazımdır ki, üzvi birləşmələrdə karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi -4-dən +4-ə qədər hər hansı bir qiymət (hətta sıfır və kəsri qiymət də) ala bilər. Hər hansı bir üzvi birləşmə molekulunda karbon atomları müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə malik olur.

Üzvi birləşmələrdə elementlərin, xüsusilə, karbon atomlarının oksidləşmə dərəcələri, adətən, maddələrin quruluş formulu yazılaraq müəyyən edilir. Məsələn, $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}(\text{OH})-\text{C}(\text{O})-\text{CH}_2-\text{COOH}$ birləşməsində:


1-ci Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi +3

2-ci Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi -2


3-cü Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi +2

4-ci Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi 0


5-ci Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi isə -1-dir. Belə ki, molekuldakı hər bir karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi müəyyən edilərkən, bütün C-C rabitələri qeyri-polyar, C-E (burada E – hər hansı bir kimyəvi elementdir) rabitələri isə polyar rabitələr kimi qəbul edilir. E elementinin elektromənfililiyi C-nun elektromənfililiyi ilə müqayisə edilərək, onun oksidləşmə dərəcəsi hesablanaraq müəyyən edilir. Burada, həmçinin atom və funksional qrupların -I, -M və +I, +M effektləri də nəzərə alınır. Məsələn:




Üzvi kimyadakı oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları da qeyri-üzvi kimyadakılar kimi ümumi qayda və prinsiplərə tabedir: onların təsnifatı, reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılmasındakı elektron-balansı metodu və s. Lakin fərqli cəhətlər də var; belə ki, üzvi kimyadakı oksidləşmə-reduksiya proseslərinə hər şeydən əvvəl, verilmiş üzvi birləşməyə uyğun baxılır və molekulda reaksiya mərkəzi olan karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsilə əlaqələndirilir. Bu reaksiyalar birləşmə, qopma, əvəzetmə və s. tiplər üzrə baş verə bilər. Məsələn, asetilenin hidratlaşması (Kuçerov reaksiyası) və ya onun HCl ilə birləşmə reaksiyaları ilk baxışda oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları hesab olunmur:



Əsil həqiqətdə isə bu hər iki reaksiya molekul daxili oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarıdır:



Bu reaksiyada 1-ci karbon atomu 2-ci karbon atomuna bir elektron verir, nəticədə 1-ci və 2-ci karbon atomları arasında molekul daxili elektron keçidi (miqrasiyası) baş verir, 1-ci karbon atomu oksidləşir (yəni reduksiyaedici kimi çıxış edir), 2-ci karbon atomu isə reduksiya olunur (yəni oksidləşdirici kimi çıxış edir). Kuçerov reaksiyasında da oxşar hadisə baş verir:




Çox vaxt üzvi kimyada olan oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları hidrogen və ya oksigen atomlarının substrata birləşməsi (uyğun olaraq, hidrogenləşmə və ya oksidləşmə və yanma reaksiyaları) və ya onların substratdan qopması ilə (uyğun olaraq, dehidrogenləşmə və ya deoksidləşmə reaksiyaları) müşayət olunur.

Üzvi kimyadakı ORR-ə bir çox misallar göstərmək olar:


I. Üzvi birləşmələrin hidrogenləşməsi (ikiqat və üçqat rabitələrin hidrogenləşməsi) – bu reaksiyalarda substrat (burada H_2 ilə reaksiyaya girən maddə) reduksiya olunur (oksidləşdiricidir), hidrogen (burada o, reagentdir) isə oksidləşir (reduksiyaedicidir). Bu tip reaksiyalara aiddir:

1. Karbohidrogenlərin hidrogenləşməsi:


a) Alkenlərin hidrogenləşməsi. Məsələn:




Etilenin homoloqları quruluşlarından asılı olaraq, müxtəlif sürətlə hidrogenləşir. Belə ki, ikiqat rabitə yanında əvəzləyicilərin sayının artması reaksiyanın sürətini nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır. Etilen karbohidrogenlərinin hidrogenləşmə sürətinin azalması aşağıdakı kimidir:




b) Alkadienlərin hidrogenləşməsi – H_2 -nin qoşulmuş alkadienlərlə 1:1 mol nisbətində reaksiyası zamanı 1,2- və 1,4-vəziyyətə birləşmə məhsullarının çıxımı, əsasən, temperaturdan asılıdır. Temperatur artdıqca ($t > 40^\circ C$) 1,4-vəziyyətə birləşmə məhsulunun çıxımı, azaldıqda ($t < 0^\circ C$) isə 1,2-vəziyyətə birləşmə məhsulunun çıxımı artır. Məsələn:




c) Alkinlərin hidrogenləşməsi.






Asetilen asan hidrogenləşir. Platin qarası üzərində, yaxud Reney nikeli iştirakında etana çevrilmə prosesi baş verir, adi nikel üzərində, əsasən etilen alınır. Beləliklə, katalizatorun xarakterindən və alkinlərin hidrogenləşməsi prosesinin şəraitindən asılı olaraq, reaksiyanı mərhələli aparmaq olar:




Lindlar katalizatorunun (Pd, PbO və CaCO₃) iştirakı ilə alkinləri alkenlərə qədər reduksiya etmək olur (üçqat rabitəyə sis-birləşmə):



d) *Tsikloalkanların hidrogenləşməsi* - üç-, dörd- və beşüzvlü tsikloalkanlar katalitik hidrogenləşir – tsikl açılır, 1 mol H₂ birləşir və müvafiq alkan alınır. Tsikl böyüdükcə, birləşmə çətinləşir. Tsikloheksan isə hidrogenləşdirici katalizatorlarla qızdırdıqda o, dehidrogenləşərək aromatləşir və benzola çevrilir:




e) *Arenlərin hidrogenləşməsi* - normal təzyiqdə nikel katalizatoru üzərində benzol 200-220°C-də 80-90% tsikloheksana hidrogenləşir (reduksiya olunur – oksidləşdiricidir):




2. Oksigenli birləşmələrin hidrogenləşməsi:

a) Fenolların hidrogenləşməsi:



Fenolun katalitik hidrogenləşməsini nikel katalizatoru üzərində 180°C-də, ya da maye fazada hidrogenin təzyiqi altında həyata keçirmək mümkündür. Nəticədə tsikloheksanolla yanaşı, az miqdarda tsikloheksanon da əmələ gəlir:






Əgər reaksiyada reduksiyaedici reagent kimi ammoniyak götürülsə, birli amin, birli amin götürüldükdə isə ikili amin alınır.

5. Alkil- və arilhalogenidlərə metalların təsiri (bu üsul Li- və Mg-üzvi birləşmələrin, alkanların və tsikloalkanların alınmasında çox geniş tətbiq edilir):




Vürs reaksiyasında da oksidləşmə-reduksiya prosesi baş verir (bu həm də dehalogenləşmə reaksiyasıdır). Məsələn:




6. Üzvi birləşmələrin halogenləşməsi. Bu reaksiyalarda halogenlər oksidləşdirici olur.



a) *Doymuş birləşmələrin halogenləşməsi* (əvəzətmə reaksiyasıdır). Məsələn:



b) *Doymuş birləşmələrin halogenləşməsi* (birləşmə reaksiyasıdır). Məsələn:




7. Bütün yanma və katalitik oksidləşmə reaksiyaları. Məsələn:




7. Parçalanma (eliminləşmə) reaksiyaları da ORR sayıla bilər:


a) *dehidrogenləşmə reaksiyaları*. Məsələn:




b) *dehalogenləşmə reaksiyaları*. Məsələn:




c) *monohalogenli törəmələrin dehidrogenhalogenləşmə reaksiyaları*.




Lakin dihalogenli törəmələrin dehidrogenhalogenləşmə reaksiyaları ORR deyil. Məsələn:




d) *dehidratlaşma reaksiyaları*. Məsələn:




e) *krekinq və piroliz reaksiyaları*. Məsələn:




8. *İzomerləşmə reaksiyaları* da molekul daxili ORR sayıla bilər. Məsələn:




9. *Nitrolaşma reaksiyaları*. Məsələn:



10. *Zinin reaksiyası- nitrobirləşmələrin aminlərə reduksiyası*. Məsələn:



11. *Vaqner reaksiyası* – etilenin KMnO_4 -ün suda məhlulu ilə oksidləşməsi:



Üzvi kimyada ORR-ə çoxlu sayda digər reaksiyaları da misal göstərmək olar.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Abbasov V., Abbasov M., Xanlarov T. və b. Kimya (abituriyentlər üçün dərs vəsaiti), Bakı, "Abituriyent", 2018
2. Мануйлов А. В., Родионов В. И. Основы химии. Интернет-учебник, основан в 2001 г. Последнее обновление 2017 г.
3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии, Современный курс для поступающих в вузы. Т.1/ Кузьменко Н.Е. и др.-16-е изд., перераб. и доп.-М.: Экзамен, 2016
4. Рэмсден Э.Т. Начала современной химии. – Л.: Химия, 1989
5. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы.-М.: Высшая школа, 1993
6. Химия: Справочные материалы / Под ред. Ю.Д.Третьякова. 3-е изд.-М.: Просвещение, 1993.

Н.А.Акперов, С.З.Абдуллаева

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии

РЕЗЮМЕ

Эта статья посвящена к объяснению окислительно-восстановительных реакций (ОВР), встречающихся в органической химии средней школы. В этой статье а также имеет места определение степени окисления элементов удобным способом в органических соединениях. Выяснено основной сушность ОВР в органической химии, доказано, что некоторые реакции не являющейся ОВР в первой взглядь, на самом деле являются ОВР, и показаны примеры по этому поводу.

N.A. Akperov, S.Z. Abdullaeva

Redox reactions in organic chemistry

SUMMARY

This article is devoted to the explanation of redox reactions (OVR) found in school organic chemistry. In this article, as well, a determination is made of the degree of oxidation of elements in a convenient way in organic compounds. The main dryness of OVR in organic chemistry is clarified, it is proved that some reactions that are not OVR at first glance are actually OVR, and examples are shown on this subject.

Açar sözlər: oksidləşdirici, reduksiyaedici, oksidləşmə prosesi, reduksiya prosesi, molekul daxili oksidləşmə-reduksiya, molekullararası oksidləşmə-reduksiya, oksidləşmə dərəcəsi.

Ключевые слова: окислитель, восстановитель, процес окисления, процес восстановления, внутримолекулярная окислительно-восстановительная реакция, межмолекулярная окислительно-восстановительная реакция, степени окисления.

Key words: oxidizing agent, reducing agent, oxidation process, reduction process, intramolecular redox reaction, intermolecular redox reaction, oxidation state.