

METAL KOMPLEKS KATALIZIN NAILIYYƏTLƏRİ

T.Ə. Ağdamski, Ş.A. Məmmədova, M.E.Şəfiyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fiziki və üzvi kimya elmləri sərhəddində yaranmış katalitik kimya elminin son illərdə bir neçə istiqamətdə sahələri yaranmışdır. Bunlara nanokataliz, spinkataliz, metalkompleks sahələrini göstərmək olar. Metal kompleks kataliz katalitik kimya elminin praktiki və nəzəri əhəmiyyət kəsb edən sahəsinə aiddir. Tədqiqatçıların bu istiqamətə olan diqqətləri daha da artmaqdadır. Buna əsas səbəb isə keçid metal komplekslərinin geniş imkanlara malik olmalarıdır.

Müasir kimya sənayesində kompleks birləşmələrlə katalizə böyük diqqət yetirilir. Bu növ katalizdə heterogen katalizə aid olan bir neçə mürəkkəb xarakterli tədqiqatların aparılmasına ehtiyac olmur. Metalliqand qarşılıqlı təsiri probleminin nəzəri əhəmiyyəti zərif üzvi sintezdə keçid metal komplekslərindən istifadə olunması ilə əlaqədardır. Üzvi maddə molekulları ilə koordinasiyaya daxil olaraq onların elektron quruluşunda dəyişikliyi sürətləndirən yalnız protonlar deyil, elektron çatışmazlığı olan başqa atom və molekullarda ola bilər. Belə xassəli maddələr Luis turşuluğuna malik olan birləşmələrdir. Onların mühüm nümayəndələri BF_3 , Al, Ti, Sn, Hg halogenləridir. Daha geniş katalitik fəallığa malik keçid element atomları və onların əsasında alınan müxtəlif komplekslərdir. Məlumdur ki, keçid metalların xarici elektron təbəqələrinin *s* və *p* səviyyələri əvvəlki *d* səviyyəsinə yaxın olur. Keçid metal atom və ionlarının başqa maddə molekul və yaxud bir neçə liqandla kompleks birləşməsini əmələ gətirir. Metal ionuna liqandaların (NH_3 , NH_2 , CN^- , CrO_4^{2-}) birləşməsi ionun katalitik xassəsini keyfiyyət və kəmiyyətə dəyişdirir. Mis ionu hidrogen peroksidi zəif parçaladığı halda $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ kompleks ionu fəallığı milyon dəfəyə qədər artırır. Kompleks katalizatorların katalitik təsiri koordinasiya sferasına substrat molekullarının daxil olması ilə zəif rabitəli liqandaların çıxarılması nəticəsində yaranır.

Bu sahədə daha geniş tədqiqatlar kompleks birləşmələrlə kiçik molekulların CO, H₂, N₂, CO₂, O₂ və s. fəallaşdırılması istiqamətində aparılmışdır.

Üzvi təbiətli liqandalar bir qayda olaraq bir-biri ilə əlaqəli olmurlar. Onlar arasında dəfətmə qüvvələri təsir göstərir. Liqandalar arasında molekullar arası cəzətmə qüvvəsi yarana bilər və bu qüvvə hidrogen rabitəsi xarakterində olur. Mərkəzi atomla liqandalar iki mərkəzli σ , π , δ rabitələrlə əlaqələnə bilər. Eyni zamanda çox mərkəzli rabitələrdə ola bilər, əgər nüvə liqand rabitəsi iki


mərkəzli olarsa bu zaman koordinasiya ədədi σ rəbitənin sayına bərabər olar. Əgər nüvə liqand rəbitəsi çox nüvəli olarsa onda liqandın dentatlığını və koordinasiya ədədini təyin etmək qeyri mümkün olur. Mərkəzi ionun oksidləşmə dərəcəsi (elektrovalentlik) kompleks hissəciyin yükü ilə liqandların formal yüklərinin cəminin fərdinə bərabərdir. Liqandaların metal ilə əmələ gətirdiyi kimyəvi rəbitənin xarakterinə görə kataliz üçün əhəmiyyət kəsb edən liqandalar dörd qrupa bölünür.

Birinci qrupa bir molekulyar orbitalı olan bölünməyən elektron cütünə malik liqandlar daxildir. Onlar keçid metal atomu və ya ionu ilə qarşılıqlı təsirdə olur (NH_3 , H_2O). Metalın vakantlı d, s və p -orbitaları ilə rəbitə yaradır. Bu donor σ rəbitə olur.

İkinci qrupa keçid metalla qarşılıqlı təsir qabiliyyətinə malik olan bir elektrona və bir orbitalı olan liqandlar ($\text{H}^-, \text{CH}_3^-, \text{C}_2\text{H}_5^-$) aiddir. Burada da σ rəbitə yaranır. Lakin iki elektronlu rəbitənin yaranması üçün bir elektronlu metal orbitalı olmalıdır. Belə rəbitənin yaranması üçün metalın elektronu rəbitə daşıyıcı orbitaldan rəbitə yaradıcı orbitala keçməlidir, yəni metal oksidləşməlidir.

Üçüncü qrupa metalın iki valentlik orbitaları ilə qarşılıqlı təsirdə malik olan iki tamamlanmış orbitalı liqandlar Cl^- , Br^- , I^- aiddir. Onlar iki rəbitə yaradırlar: metalın $d_{x^2-y^2}$ orbitalı ilə liqandların p_x orbitalı arasında σ rəbitə, metalın d_{xy} orbitalı ilə liqandın p_x orbitalı arasında π rəbitə. Onların hər ikisi donor rəbitədir, yəni hər iki cüt elektronlar liqanda aid olur. Metalla kovalent rəbitə yaranan zaman metalda elektron sıxlığı artır. Ona görə də liqandlar metalın koordinasiya sferasında davamlı olurlar. Metal kompleks katalizdə bu növ liqandlar nadir halda iştirak edir.

Dördüncü qrupa metalla qarşılıqlı təsirdə ola bilən tamamlanmış və vakantlı orbitalara malik liqandlar (CO , olefinlər, fosfin) daxildir. Bu qrup liqandlardan homogen metal kompleks katalizdə daha geniş surətdə istifadə edilir. Karbon (II) oksid ilə metal atomunun koordinasiyası zamanı ikiqat rəbitə yaranır (şəkil 1). Elektronların karbon (II) oksid molekulunun tamamlanmış əlaqələndirici orbitalından metalın $d_{x^2-y^2}$ vakantlı orbitala keçməsi nəticəsində donor rəbitə (şəkil 1a), digər tərəfdən elektronların metalın tamamlanmış d_{xy} orbitalından karbon (II) oksid rəbitədəşıyıcı π -orbitalına keçməsi ilə akseptor π -rəbitə yaranır (şəkil 1b). Keçid metal kompleksində belə ikiqat rəbitənin xarakteri dativ adlanır.



Şəkil 1. Keçid metalın CO liqandı ilə dativ rəbitəsi

a - σ rəbitə:

1 – keçid metalın $d_{x^2-y^2}$ vakantlı orbitalı;


2 – CO-nun tamamlanmış rəbitə yaradıcı σ -orbitalı.

b - π -rəbitə:


1 - keçid metalın tamamlanmış d_{xy} orbitalı;

2 – CO-nun vakantlı rəbitə dağıdıcı π -orbitalı.

Metal kompleks katalizatorlar iştirakilə reaksiyalar daha yumşaq şəraitdə gedir. Belə reaksiyalara ammoniyakın sintezi, etilenin hidrogenləşməsini göstərmək olar. Etilenin hidrogenləşməsi ümumi halda




tənliyi üzrə gedir. Reaksiyanı mərhələlərlə göstərsək:



alınır.

Katalizator iştirak etmədən reaksiyanın sürəti zəif olur. Ona görə ki, hidrogen molekulunda atomlar arası rəbitənin qırılmasına çox miqdar enerji tələb edilir. Lakin bu reaksiya rədiüm kompleks katalizatoru iştirakilə daha asan gedir:




Metal kompleksini ΦM ilə göstərək.


Burada Φ – koordinasiya sferası;

M – metalı göstərir.

Göstərilən katalitik reaksiyanın birinci mərhələsini hidrogen molekulunun kompleksə birləşməsi təşkil edir:




Burada H-H rabitəsinin qırılmasına sərf olunan enerji hidrogenlə metal arasında əmələ gələn rabitə enerjisi ilə kompensə olunur. İkinci mərhələ aşağıdakı ardıcılıqla gedir:




Kompleksin koordinasiya sferasına etilen molekulunun birləşməsi, rabitələrin paylanması nəticəsində son məhsul və katalizator ayrılır.

Metal kompleks katalizatorlar həm homogen həm də heterogen katalizin katalizatorları ola bilər. Homogen metal kompleks katalizin tətbiqi ilə sənayedə həyata keçirilən iki mühüm əhəmiyyət kəsb edən prosesləri göstərək. Bunlardan birincisi havanın oksigeni iştirakilə etilenin asetaldehidə oksidləşməsidir. O, sənayedə Vaker prosesi adlanır.




Sənaye Vaker prosesində etilen və oksigen reaktora verilir, məhlulda başqa ionlarla yanaşı H_3O^+ , Cu^{2+} , Cl^- , $PdCl_4^{2-}$ ionları da olur. Proses 300-400 K və 0,3 MPa təzyiqdə aparılır.


İkinci proses olefinlərin hidroformilləşməsi və ya oksosintezdir. Burada olefinə karbon 2-oksidi və hidrogenlə təsir etməklə şaxələnmiş və şaxələnməyən quruluşa malik aldehid qarışığı alınır:



Oksosintez reaksiyası maye üzvi fazada aparılır. Katalizator olaraq Uilkinson kompleksindən $Rh(CO)Cl(PPh_3)_2$ istifadə edilir. Burada *P*-fenil, Ph_3 - fosfin qrupudur. Bu kompleksin iştirakilə şaxələnməyən aldehidin alınması sxem şəklində göstərmək olar:



Bu iki mərhələ nəticəsində katalizatorun başlanğıc vəziyyətindən işçi (1) alınır. Sadəlik üçün keçid metal (*Rh*) və koordinasiya sferası göstərilmişdir. Sonra altı ardıcıl elementar mərhələlərlə aldehid alınır.




I və II mərhələlərində CO və CH_2CHR liqandlarının birləşməsi ilə koordinasiya ədədi 6 olan III kompleksi alınır. III, IV mərhələləri üzrə tsis daxil edilməklə V kompleksinin daxilində $\text{RCH}_2\text{RCH}_2\text{CHO}$ aldehidi sintez edilir. Hidrogen molekulunun oksidləşdirici birləşməsindən sonra (VI kompleks) $\text{RCH}_2\text{RCH}_2\text{CHO}$ aldehidi ayrılır və katalizator (I kompleksi) bərpa olunur. Metal kompleks katalizatorla pronilenin hidroformilləşmə reaksiyasının kinetikasi aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:

$$V = KC_k \cdot C_{pr} \cdot P_H^2$$

Metal kompleks kataliz sahəsində əldə edilən mühüm nəticələrdən bəzilərini qeyd edək:

1. Alkanların fəallaşdırılması və funksionallaşdırılması.
 - a. Palladium duzlarının təsiri ilə alkanların oksidləşdirici funksionallaşdırılması

$$RH + Pd(OCOFCF_3)_2 = ROCOFCF_3 + Pd + CF_3COOH$$
 Reaksiya 80⁰ C, 60 atmosferdə 3-4 s. ərzində gedir. Çıxım 60% təşkil edir.
 - b. Sulu məhlullarda platin duzlarının təsiri ilə metil qruplarının seçici hidrosilləşdirilməsi. Etanolun etilen qlikola birbaşa çevrilməsi:



Reaksiya 120⁰ C gedir.

- c. Otaq temperaturunda doymuş və alkilaromatik karbohidrogellərin havanın oksigeni ilə oksidləşdirilməsi.
2. Hidrometilləşdirilmə reaksiyası.
 Bu istiqamətdə etilenin, asetilenin və karbon monooksidin hidrometilləşdirilməsi

$$CH_2 + C_2H_4 \rightarrow C_3H_6; CH_4 + C_2H_2 \rightarrow C_3H_6; CH_4 + CO \rightarrow CH_3CHO$$
 Reaksiya 20-50⁰ C də, dəmir, nikel, titan kompleks katalizatorlar iştirakilə gedir.
3. Alkan və orenlərin işıq şuası təsiri ilə katalitik funksionallaşdırılması
4. Doymuş karbohidrogenlərdə C–C rabitəsinin fəallaşdırılması.

Üzvi aproton superturşuların kəşfi alkan və alkenlərin bir neçə istiqamətdə çevrilməsinə şərait yaratmışdır. Nəticədə parafinlərin aşağı temperaturda kimyəvi sahəsi yaranmış və inkişaf etmişdir. Alkan və alkenlərinə C–C rabitəsinin mayefazalı katalitik qırılmasının həyata keçirilməsi ilkin tədqiqatlardan biri hesab olunur.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Ağlamski T.Ə. “Kimyəvi kinetika və kataliz”, B., 2000
2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П.
3. «Физическая химия», М., 1988.
3. Успехи химии, т. 59, в. 12, 1990.

Агдамский Т.А., Мамедова Ш.А., Шафиева М.Е.

Успехи металлокомплексного катализа

АННОТАЦИЯ

В статье изложены основные характеристики и некоторые наиболее важные результаты в области металл комплексного катализа: активация и функционализация алканов, селективное окисление метана в метилтрифторацетат, селективное гидрокселирование метильных групп под действием солей платины в водных растворах. Прямое превращение этанола в этиленгликоль. Реакция гидрометилирования активация С-С связи в насыщенных углеводородах.

Охарактеризован четыре групп лигандов имеющих значение для катализа: лиганды, имеющие только одну молекулярную орбиталь, лиганды имеющие одну орбиталь с одним электроном, лиганды с двумя заполненными орбиталями, лиганды имеющие наряду с заполненными также вакантные орбитали.

Рассмотрены и оценены достижения последних лет в области создания и применения металл комплексного катализа, вероятный механизм наиболее важных промышленных процессов. Вакер процесс-окисление этилена в ацетальдегид кислородом воздуха, и оксосинтез или гидроформилирование олефинов.

Agdamskiy T.A., Mammadova Sh.A., Shafiyeva M.E.

Advances metal complex catalysis

ANNOTATION

The article describes the main characteristics and some of the most important results in the field of metal complex catalysis: activation and functionalization of alkanes in the selective methane oxidation ethyl trifluoroacetate, selective hydroxylation of the methyl groups by salts of platinum in aqueous solutions. Direct conversion of ethanol into ethylene. Chloromethylation reaction activation of the C-C bond in saturated hydrocarbons.

Characterized by four groups of the ligand are important for catalysis: ligands having only one molecular orbital, ligands having a single electron orbital, ligands with two occupied orbitals having ligands along with filled and vacant orbitals.

Examined and evaluated the achievements of recent years in the development and application of metal complex catalysis probable mechanism of the most important industrial processes. Wacker-oxidation process of ethylene to acetaldehyde oxygen, and oxo synthesis or hydroformylation of olefins.

Açar sözlər: kataliz, liqand, hidroformilləşmə

Ключевые слова: катализ, лиганда, гидроформализация

Key words: catalysis, the ligand, hydroformalization