


## ŞAĞIRDLƏRİN MÜSTƏQİL İŞİ KİMİ KİMYANIN TƏDRİS VAHİDLƏRİNƏ AİD REFERATLARIN HAZIRLANMASI

A.C. Mahmudova

Gəncə Dövlət Universiteti, doktorant


Şagirdlər dərslük üzərində zehni fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdikləri bilikləri sistemləşdirmək üçün hər bir tədris vahidinə aid aşağıdakı tiptə referatlar hazırlamalıdır.

### Kimyanın ilk anlayışları tədris vahidinə aid referat

Kimya-maddələr, onların xassələri və çevrilmələri haqqında elmdir					
↓					
Fiziki cisimlər nədən təşkil olunmuşdursa, ona maddə deyilir					
Tərkibinə görə maddələr iki yerə bölünür		Maddələr atom və molekullardan ibarətdir		Bir maddəni digərlərindən fərqləndirən əlamətlər onun xassəsi adlanır	
↓		↓		↓	
Bəsit maddələr eyni növ atomlardan ibarətdir	Mürək-kəb maddələr müxtəlif növ atomlardan ibarətdir	Atom maddənin kimyəvi cəhətdə bölünməyən ən kiçik hissəciyidir	Molekul maddənin tərkibi və xassəsini özün də saxlayan ən kiçik hissəciyidir və kimyəvi cəhətdən bölünəndir	Bir maddənin başqa maddəyə çevrilməsi kimyəvi xassə adlanır	Maddənin fiziki xassələri: aqrekat halı, rəngi, iyi, sıxlığı, $t_{qay}$ , $t_{ərimə}$ , həll olması, elektrik və istilik keçiriciliyi
↓		↓		↓	
Maddə tərkibinin kimyəvi işarə və indekslərlə yazılışı kimyəvi formul adlanır.  <div style="text-align: center;">  </div>		Kimyəvi elementin atomunun kütləsinin, karbon atomunun kütləsinin 1/12-dən neçə dəfə ağır olduğunu göstərən kəmiyyət nisbi atom kütləsi ( $A_r$ ) adlanır.		Maddənin molekulunun, karbon atomunun kütləsinin 1/12-dən neçə dəfə ağır olduğunu göstərən kəmiyyət nisbi molekul kütləsi ( $M_r$ ) adlanır. Onu hesablamaq üçün maddənin tərkibindəki elementlərin sayı $A_r$ -ə vurulur və cəmlənir. Məsələn $M_r(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 2 \cdot 23 + 1 \cdot 12 + 3 \cdot 16 = 106$ .	

Bizi əhatə edən mühitdə baş verən dəyişikliklər hadisə adlanır.			
Fiziki hadisə - bir maddədən yeni maddə alınmaması ilə baş verən hadisədir. Belə hadisələr nəticəsində cismin ölçüsü və forması, aqreqlat halı dəyişir. Fiziki hadisələrə, ərimə donma, buxarlanma, distillə, kondensləşmə, sublimasiya, kristallaşma və s. misal göstərmək olar.	Bir maddədən yeni bir maddənin alınması ilə müşahidə olunan hadisələr kimyəvi hadisə adlanır. Kimyəvi hadisələrə, yanma, qıcqırma, çürümə, elektroliz, hidroliz, fotosintez, krekinq, korroziya və s. misal göstərmək olar.		
	Aşağıdakı əlamətlərlə müşahidə olunur. - rəngin dəyişməsi - iyin dəyişməsi - çöküntünün əmələ gəlməsi və ya həll olması - qazın ayrılması və ya udulması - enerjinin ayrılması və ya udulması.	Maddə kütləsinin saxlanması qanununa tabe olur. Reaksiyaya daxil olan maddələrin kütlələri cəmi, əmələ gələn maddələrin kütlələri cəminə bərabərdir. $m_{(\text{baş.maddələr})\text{üm.}} = m_{(\text{məhsul})\text{üm.}}$	Kimyəvi hadisələr kimyəvi tənliliklərlə ifadə olunur. Kimyəvi formul və əmsallarla kimyəvi reaksiyaların yazılışına kimyəvi tənlilik deyilir. Məsələn. $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$

Atom-müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcikdir.



proton  
( $1p^{+1}$ )

neyton  
( $1n^0$ )

Hissəciklər	Kütləsi	Yükü	Sayca necə müəyyən etmək olar.
$p^+$	1	+1	ədədi qiymətə elementin sıra nömrəsinə (2) bərabərdir.
$e^-$	1/1837	-1	Protonların sayına bərabərdir.
$n^0$	1	0	$A=p+n$ ; $n=A-P$ ; $A=A_r$ .

Neytral atom  ${}^A_pX^0$  ;  $N(e^-) = N(p)$

Kation  ${}^A_pX^{n+}$  ;  $N(p^-) < N(e^-)$ ;  $N(e^-) = N(p) - \text{yük}$

Anion  ${}^A_pX^{n-}$  ;  $N(e^-) > N(p)$ ;  $N(e^-) = N(p) + [\text{yük}]$

### Kimyada miqdari kəmiyyətlər

Kəmiyyət və onun işarəsi	Anlayış və müəyyən edilməsi	Ölçü vahidi
Maddə miqdarı ( $\nu$ )	Maddənin verilmiş hissəsindəki quruluş hissəciklərinin sayı haqqında təsəvvür yaradan kəmiyyətdir. 1 mol – karbon atomunun 12qr-da olan quruluş hissəciklərinin sayı qədər quruluş hissəciyi (atom, molekul, ion) olan maddə miqdarıdır.	mol, kmol, mmol.
Avoqadro sabiti ( $N_A$ )	1 mol maddədəki hissəciklərin sayını göstərən kəmiyyətdir. $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$	1/mol; mol <sup>-1</sup>
Hissəciklərin sayı (N)	$N = \nu \cdot N_A$	Yoxdur.
Molyar kütlə (M)	Maddənin 1 molunun qramlarla kütləsidir. Ədədi qiymətə nisbi molekul (atom) kütləsinə bərabərdir. $M = \frac{m}{\nu}$ ; $M = [M_r]$ ; $M = [A_r]$	q/mol
Molyar həcm ( $V_m$ )	Qaz halında maddənin 1 molunun normal şəraitdə ( $t=0^\circ\text{C}$ ; 1 atm təzyiq) tutduğu həcmdir. $V_m = 22,4 \text{ l}$ . $V_m = \frac{V_{(qaz)}}{\nu}$	Yoxdur.
Qazın nisbi sıxlığı	Bir qazın, digər qazdan neçə dəfə yüngül (ağır) olduğunu göstərən kəmiyyətdir. Başqa sözlə bir qazın sıxlığının digər qazın sıxlığından neçə dəfə ağır (yüngül) olduğunu göstərir.	Yoxdur.
Elementin kütlə payı ( $\omega$ )	$\omega = \frac{A_r(El) \cdot n}{M_r} \cdot 100\%$ burada n-molekuldakı kütlə payı hesablanan atomların sayıdır.	Yoxdur.
Məhlulda həll olan maddənin məhlulda (qarışıqda) kütlə payı	Məhlulda: $\omega = \frac{m_h \cdot m}{m_{m\&h}} \cdot 100\%$ Qarışıqda: $m_{(qar)} = m_1 + m_2 + m_3 + \dots$ $\omega = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} \cdot 100\%$ $m_1, m_2, m_3$ qarışıqdakı komponentlərin kütləsidir.	Yoxdur.
Molyar qatılıq (C)	$C = \frac{\nu}{V}$ ; $\nu$ -həll olan maddənin mol miqdarı, $V$ -məhlulun həcmidir (litrlə)	l/mol
Qaz qarışığında qazın həcm payı	$V_{(qarışiq)} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$ $\varphi = \frac{V_1}{V_1 + V_2 + V_3 + \dots} \cdot 100\%$	Yoxdur.

**Bəsit maddələr  
(evni növ atomlardan ibarətdir)**

<b>Metallar</b>		<b>Qeyri metallar</b>
Aqreقات halı	Hg-dən başqa hamısı bərkdir	Bərک halda olanlar (S <sub>8</sub> ; J <sub>2</sub> ;P <sub>4</sub> ; Maye halda olan Br <sub>2</sub> Qaz halında olanlar (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , F <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub> )
Metal parıltısı	Var	Yoxdur.
İstilik və elektrik keçiriciliyi	Keçirir	Əksəriyyəti elektriki keçirmir və ya pis keçirir
Plastikliyi	Var	Kövrəkdirlər

Bəsit maddələrin sayı, kimyəvi elementlərin sayından çoxdur, çünki bir neçə element, bir neçə bəsit maddə əmələ gətirir. Yəni bir neçə element üçün allotropiya xarakterikdir.

Allotropiya – kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi qabiliyyətidir. Bu bəsit maddələr həmin kimyəvi elementin allotropik şəkildəyişməsi adlanır.

Kimyəvi element	Allotropik şəkildəyişməsi	Təbiətdə yayılması	
		Sərbəst halda	Birləşmə şəkildə
O	Oksigen (O <sub>2</sub> ); ozon (O <sub>3</sub> )	+	+
S	Plastik, kristallik	+	+
C	Almaz, qrafit, karbin, fülleren	+	+
Si	Kristallik, amorf	-	+
P	Ağ(P <sub>4</sub> ), qırmızı, qara	-	+

**Bəzi bəsit maddələrin xassələri:**

- Oksigen (O<sub>2</sub>) Rəngsiz, iysiz, suda az həll olan qazdır.  
 Ozon (O<sub>3</sub>) Solğun bənövşəyi rəngli, kəskin iyli, suda yaxşı həll olan qazdır.  
 Almaz (C) Rəngsiz kristallik maddədir, çox bərkdir, istiliyi və elektriki keçirmir.  
 Qrafit (C) Tünd boz rəngli kristallik maddədir, yumşaqdır, istiliyi və elektriki keçirir.

**Mürəkkəb maddələr**

Oksidlər	Turşular	Əsaslar	Duzlar
Biri oksigen olmaqla iki elementdən ibarət mürəkkəb maddələrdir.	Hidrogen və turşu qalığından ibarət mürəkkəb maddələrdir.	Metal və hidroksid ionlarından ibarət mürəkkəb maddələrdir: $Me(OH)_n$	Metal ionları və turşu qatılığından ibarətdir.
Əsasi oksidlər: $Li_2O$ ; $Na_2O$ ; $K_2O$ ; $CaO$ ; $BaO$ ; $MgO$ ; $FeO$ ; $CrO$ ; $MnO$	Bir əsaslı turşular: $HF$ ; $HCl$ ; $HBr$ , $HJ$ ; $HNO_3$ ; $HPO_3$ ; $H_3PO_2$ və s.	Suda həll olanlar (qələvilər) $LiOH$ , $NaOH$ , $KOH$ , $Ca(OH)_2$ , $Ba(OH)_2$	Suda həll olmayan duzlar: $MgCO_3$ , $CaCO_3$ ; $FeS$ , $CuS$ ; $CaSO_4$ , $BaSO_4$ , $PbSO_4$ , $AgCl$ və s.
	İkiəsaslı turşular: $H_2S$ , $H_2SO_3$ , $H_2SO_4$ ; $H_2CO_3$ ; $H_2CrO_4$ ; $H_2SiO_3$ ; $H_3PO_3$	Suda həll olmayan əsaslar: $Mg(OH)_2$ ; $Fe(OH)_2$ , $Cr(OH)_2$ , $Cu(OH)_2$ .	
Turşu oksidləri: $CO_2$ ; $SO_2$ ; $SO_3$ ; $NO_2$ ; $P_2O_3$ ; $P_2O_5$ ; $N_2O_3$ ; $N_2O_5$ ; $Cl_2O_7$ ; $Mn_2O_7$ ; $SiO_2$ .	Üçəsaslı turşular $H_3BO_3$ ; $H_3PO_4$	Suda həll olmayan amfoter əsaslar: $Be(OH)_2$ , $Zn(OH)_2$ , $Al(OH)_3$ , $Fe(OH)_3$ , $Cr(OH)_3$ , $Pb(OH)_2$	Suda həll olanlar: $Na_2CO_3$ , $KrCO_3$ $Na_3PO_4$ ; $Kr_3PO_4$ $Na_2SiO_3$ ; $KrSiO_3$ ; $Na_2S$ , $K_2S$ və s.
	Dördəsaslı turşular: $H_4P_2O_7$ .		

Amfoter oksidlər.  
 $BeO$ ,  $ZnO$ ;  $Al_2O_3$ ,  
 $Fe_2O_3$ ,  $Cr_2O_3$ ;  $PbO$ ;  
 $PbO_2$ ;  $MnO_2$

Qarışıq oksidlər:  
 $Fe_3O_4$ ;  $Mn_2O_3$ ;  
 $Pb_2O_3$ .

### Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı

<b>I.İstilik effektinə görə.</b>	<p>İstiliyin ayrılması ilə gedən <math>C + O_2 \rightarrow CO_2 + Q</math>                      ekzotermik reaksiyalar <math>N_2 + 3H_2 \xrightarrow{t, kat} 2NH_3 + Q</math></p> <p>İstiliyin udulması ilə gedən <math>N_2 + O_2 \xrightarrow{t} 2NO -Q</math>                      endotermik reaksiyalar <math>CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2 -Q</math></p>
<b>II.Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin sayına görə</b>	<p>Birləşmə reaksiyası – iki və daha çox maddədən bir yeni maddə alınır.  <math>SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4</math>; <math>4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3</math></p> <p>Parçalanma reaksiyası – bir maddədən iki və daha çox maddə alınır.  <math>MgCO_3 \xrightarrow{t} MgO + CO_2</math>;  <math>Cu_2(OH)_2CO_3 \rightarrow 2CuO + H_2O + CO_2</math></p>
	<p>Əvəzetmə reaksiyası – bəsit maddənin atomları mürəkkəb maddənin atomlarından birini əvəz edir.  <math>Fe + H_2SO_4 (duru) \rightarrow FeSO_4 + H_2</math>;  <math>2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2</math>  <math>CO_2 + 2Mg \xrightarrow{t} 2MgO + C</math>;  <math>2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2</math></p> <p>Dəyişmə (mübadilə) reaksiyası – iki mürəkkəb maddə arasında tərkib hissələrinin dəyişməsi ilə gedir.  <math>Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2NaCl</math>  <math>CaO + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 \downarrow + H_2O</math></p>
	<p>Neytrallaşma reaksiyası – turşu və əsas arasında normal duz və su alınması ilə gedən dəyişmə (mübadilə) reaksiyasıdır.  <math>NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O</math>;  <math>Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O</math>.</p>
<b>III. reaksiyaya daxil olan maddələrin aqrekat halına görə.</b>	<p>Heterogen reaksiyalar - reaksiyaya daxil olan və alınan maddələr müxtəlif aqrekat halındadır.  <math>C(b) + O_2(q) \rightarrow CO_2(q)</math>;  <math>Zn(b) + FeSO_4(məh) \rightarrow ZnSO_4(məh) + Fe(b)</math></p>
	<p>Homogen reaksiyalar – reaksiyaya daxil olan və alınan maddələr eyni aqrekat halındadır (ya qaz; ya da maye)  <math>2CO(q) + O_2(q) \rightarrow 2CO_2(q)</math>; <math>N_2(q) + 3NH_3(q)</math>  <math>CH_3COOH(m) + CH_3OH(m) \rightarrow CH_3COOCH_3(m) + H_2O</math></p>
<b>IV. Katalizator iştirakına görə.</b>	<p>Katalitik reaksiyalar – katalizator iştirakı ilə gedir.  <math>2H_2O \xrightarrow{MnO_2} 2H_2 + O_2</math>;  <math>2KClO_3 \xrightarrow{MnO_2, t} 2KCl + 3O_2</math></p> <p>Katalitik olmayan reaksiyalar – katalizator iştirak etmir:  <math>H_2 + Cl_2 \xrightarrow{hv} 2HCl</math>; <math>S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2</math>                      Bütün dəyişmə reaksiyaları</p>

<b>V. İstiqamətinə görə.</b>	Dönməyən reaksiyalar – yalnız bir istiqamətdə gedir. $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaNO}_3$
	Dönən reaksiyalar – verilmiş şəraitdə hər iki istiqamətdə gedir. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ; $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl}$
<b>VI.Element atomlarının oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsinə görə</b>	Oksidləşmə - reduksiya reaksiyaları – oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Bütün yanma, əvəzətmə reaksiyaları, elektroliz, korroziya.
	Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməməsi ilə gedən reaksiyalar; dəyişmə (mübadilə), neytrallaşma reaksiyaları, hidroliz.

**Qarışıqlar**

↙ ↘

**Eynicinsli (homogen). (heterogen)**      **Müxtəlifcinsli qarışıqlar**


Qarışığı əmələ gətirən maddələrin hissəcikləri nə gözlə, nə də mikroskopla görünürsə belə qarışıqlara eynicinsli (homogen) qarışıqlar deyilir.	
Qarışıqlar	Ayrılma üsulu
Qaz+qaz(hava)	Fraksiyalı distillə
Qaz+su HCl+su HBr+su HJ+su NH <sub>3</sub> +su	Buxarlanma: İlk növbədə qarışıqdan qaz ayrılır.
maye+maye metamol+su etanol+su	Distillə: İlk növbədə qarışıqdan spirt ayrılır.
Bərk+maye Qələvi+su Şəkər+su NaCl+su Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> +su	Buxarlanma: İlk növbədə qarışıqdan su ayrılır.
Maye+maye Neft Benzin kerosin	Fraksiyalı distillə, xromotoqrafiya

Qarışığı əmələ gətirən maddələrin hissəcikləri həm mikroskopla, həm də gözlə seçilir.	
Qarışıqlar	Ayrılma üsulu
Qaz-maye Duman	Kondensləşmə
Maye-maye (emulsiya) Neft-su Benzin-su Kerosin+su Benzol+su Anilin+su	Ayrııcı qıfla
Bərk+maye (suspensiya) Təbaşir+su Gil+su	Çökdürmə, süzmə, filtirləmə, durultma.
Bərk+maye (suspensiya); Qum+su CaSO <sub>4</sub> +su AgCl+su BaSO <sub>4</sub> +su	Çökdürmə, süzmə, filtirləmə, durultma.
Bərk+maye; Kükürd+su	Süzmə, filtirləmə

**Dispers sistemlər**  
(Bir maddənin kiçik hissəciklər şəklində başqa maddə içərisində paylanmasıdan alınan sistemlərdir)

Asılqanlar (Müxtəlifcinsli qarışıqlardır.	Kolloid məhlul.	Həqiqi məhlul eynicinsli-homogen qarışıqdır.
Paylanan hissəciklərin ölçüsü 100nm-dən böyük olur)	Paylanan hissəciklərin ölçüsü 1-100nm arasında olur.	Qaz+maye HCl+su HBr+su HJ+su NH <sub>3</sub> +su
I. Emulsiya (maye+maye müxtəlif cinsli qarışıqdır). Neft+su Kerosin+su Benzin+su Bitkiyağı+su Benzol+su Anilin+su	Nişasta yapışqanı Silikat yapışqanı	Maye+maye Metanol+su Etanol+su HNO <sub>3</sub> +su H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> +su
II. Suspenziya Bərk-maye müxtəlifcinsli qarışıqdır. Təbaşir +su Gil+su		Bərk+maye Qələvi+su Həll olan duz+su H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> +su

**Məhlulun doymuşluğu maddənin həll olmasından asılıdır.**





**Həqiqi məhlullar**  
(Həll olan maddə və həlledicinin hissəciklərindən və ya onların qarşılıqlı təsir məhsullarından ibarət eynicinsli (homogen) sistemlərdir

<p>Həllolma fiziki-kimyəvi prosesdir. Həll olan maddənin hissəciklərə ayrılması kimyəvi, ayrılmış hissəciklərin hidratinin diffuziyası fiziki prosesdir.</p>	<p>Həll olan maddənin miqdarına görə. I. Duru məhlul: Həll olan maddənin miqdarı həlledicidən çox-çox azdır. II. Qatı məhlul: Həll olan maddə və həlledicinin miqdarı bir-biri ilə müqayisə ediləndir.</p>	<p>Doymuşluğuna görə. I. Doymuş məhlul: Verilmiş temperaturda həll olan maddənin əlavə miqdarı həll olmur. II. doymamış məhlul: Verilmiş temperaturda həll olan maddənin əlavə edilmiş miqdarı həll ola bilər. III. İfrat doymuş məhlul. Verilmiş temperaturda həll olan maddənin miqdarı doymuş məhluldakından çox olur.</p>	<p>Aqreقات halına görə. I. Bərk məhlullar: Metal ərintiləri II. Maye məhlullar. Duzların qələvilərin suda məhlulu. III. Qaz+qaz qarışığı Məsələn hava.</p>
--	--	---	--

**Elektrolitik Dissosiasiya.**

<p>Qeyri-elektrolit-suda həll etdikdə və ya əritdikdə elektrik cərəyanını keçirməyən maddələrdir. Bütün növ spirtlər, karbohidratlar, suda az həll olan və olmayan maddələr.</p>	<p>Elektrolitlər-suda həll etdikdə və əritdikdə elektrik cərəyanını keçirən maddələrdir. suda həll olan bütün duzlar, qələvilər, qüvvətli turşular.</p>
↓	↓
<p>Kovalent polyar və az polyar kimyəvi rabitəli maddələrdir</p>	<p>İon və qüvvətli polyar kovalent rabitəli maddələrdir</p>

### Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin əsas müddələri

(elektrolitin ionlara ayrılması prosesi elektrolitik dissosiasiya adlanır).

- 1) Elektroliti əritdikdə və suda həll etdikdə ionlarına ayrılır (dissosiasiya edir).  
Həllolma zamanı dissosiasiyaya səbəb sudur, çünki o, kristal qəfəsi və kimyəvi rabitəni qırır, ərimə zamanı isə dissosiasiyaya səbəb yüksək temperaturdur.
- 2). Elektrik cərəyanı təsirindən ionlar istiqamətlənmiş hərəkət edir, müsbət yüklü ionlar (kationlar) katoda, mənfi yüklü ionlar (anionlar) anoda doğru hərəkət edir.
- 3) ionların xassələri, onları əmələ gətirən atomların xassələrindən fərqlənir.
- 4) elektrolitik dissosiasiya prosesi – dönən prosesdir, ona görə də dissosiasiya dərəcəsi ( $\alpha$ ) ilə xarakterizə edilir. Bu kəmiyyət elektrolitin neçə molekulunu dissosiasiya etdiyini göstərir.

$$\alpha = \frac{n}{N} \cdot 100\%$$

$$\alpha = \frac{V_{dis}}{V_{üm}} \cdot 100\%$$

n-elektrolitin dissosiasiya etmiş molekulunun sayı;

N-elektrolitin həll olmuş ümumi molekullarının sayını;

$V_{dis}$  – elektrolitin dissosiasiya etmiş mol miqdarını;

$V_{üm}$ -elektrolitin həll olmuş ümumi mol miqdarını göstərir.

#### İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. M.M.Abbasov, V.M.Abbasov və b. VII siniflər üçün kimya dərslisi. Bakı, Azpoliqraf, 2017, 94 s.
2. M.M.Abbasov, V.M.Abbasov və b. VIII siniflər üçün kimya dərslisi. Bakı, Azpoliqraf, 2018, 200 s.

*Aynara Maxmudova*

**Составление рефератов как самостоятельных работ учащихся по отдельным разделам химии**

**РЕЗЮМЕ**

В статье представлены образцы методов составления рефератов по отдельным разделам общей химии.

*Aypara Mahmudova*

**Preparation of the abstracts on chemistry teaching units as students' independent works**

**SUMMARY**

The examples of the methods for preparation of abstracts on general chemistry teaching units are presented in the article.

**Açar sözlər:** referat, müstəqil iş, kimyəvi formullar əsasında hesablamalar, kimyanın nəzəri əsasları.

**Ключевые слова:** реферат, самостоятельная работа, расчеты на основе химических формул, теоретические основы химии.

**Key words:** abstract, independent work, calculations on chemical formulas, theoretical bases of chemistry.